

Alumpak Loción
Prospecto x 30 ml. Vta.



Cloruro De Aluminio Hexahidratado

Uso externo
Loción

Industria Argentina | Venta bajo receta

FÓRMULA

Cada 100 ml de loción contiene **Cloruro de aluminio hexahidratado** 20 g.
Excipientes: Alcohol etílico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Anhidrótico.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Humedecer un hisopo de algodón con **Alumpak** loción, y aplicar sobre el área afectada una vez al día, por la noche, al acostarse.
Para prevenir una irritación, el área afectada debe estar perfectamente seca antes de aplicar el producto.
Para lograr un máximo efecto, el médico puede indicar cubrir el área tratada con un film de celofán, mantenido en su lugar con ayuda de una media, guante o prenda de algodón. No adherirlo con cintas adhesivas.
Lavar el área tratada a la mañana siguiente. La excesiva transpiración será detenida después de la primera o segunda aplicación, pero conviene aplicar durante una semana.
Mantener el efecto aplicando el producto una o dos veces por semana, o según se presente la necesidad.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las sales de aluminio.

AS1817 0526

ADVERTENCIAS AL PACIENTE

Alumpak loción, es un producto para uso externo. No aplicar sobre membranas sensibles, boca, ojos, etc.; ni sobre la piel con irritaciones, escamosis o heridas. Si se ha rasurado o depilado anteriormente el área a tratar, dejar pasar 24 horas antes de aplicar **Alumpak** loción.

Colores: ■ Negro

Producto: Alumpak. Vta. Sieg.

Presentación: Loción x 30 ml.

Material: Prospecto en Taco. Predoblado.

Plano N°: 000835_45_P-TP_TER_TP_100a260_B.

Sustrato: Papel Obra de 1ª gramaje 50 grs/m²

Medidas: 120 x 140 mm. Plegado final: 120 x 28 mm.

Código de material: 3005202841. **Fecha:** 05/2026

Película: AS1817 0526.

Cod. óptico: 46/L141

Máquina: TERCERO

Reemplaza: 3005202840 - Pel.: AS1134.

Cambio domicilio de elaborador a Gezzi.

En caso de producir reacciones cutáneas, suspender el tratamiento.
El contacto directo con la ropa puede perjudicar las telas.
Luego de usar, mantener el envase bien cerrado para prevenir la evaporación del producto.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / 4962-2247. Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

Alumpak loción: Envase conteniendo 30 ml.

*Conservar entre 5 y 35° C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene alcohol, mantener alejado del fuego.*

Elaborado en Fraga 1274/76, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirección Técnica: María Eugenia Belgiorno - Farmacéutica.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 39.347.

Siegfried S.A. Carlos Calvo 2756, C1230AAT, C.A.B.A.

Información a profesionales y usuarios: 0810-333-5431
www.siegfried.com.ar

Fecha de última revisión: Agosto de 1991.

3005202841 AS1817 0526 46/L141

